

KIT MOUCHES DES ARBRES FRUITIERS



DESCRIPTIF PRODUIT

Poly et isobutène + agent diluant

Support	Chromatiques
Utilisation	Piégeage
Cible	Mouches ravageuses des fruits (cerises, olives, agrumes)
Usages	Grand public
Zones d'utilisation	Sur les arbres
Référence(s)	PV-APP-01012 Kit : 6/carton PV-GLU-01026 : Glu - 12/carton PV-APP-01013 : 5 pièces rigides à engluer + accessoires montage : 12/carton

METHODE D'APPLICATION

Appliquer la glu à 20-30 cm du support. Un aérosol de 750 ml permet l'engluement d'environ 7 m² de plaques chromatiques (soit environ 8 pièges PROTECTA).

En cas d'utilisation en détection, un piège suffit tous les 5 arbres.

Pour un piégeage massif, il faudra mettre un piège par arbre, voire 2 s'il est volumineux (4 à 5 mètres d'envergure).

Pour les agrumes, un piège tous les 5 à 6 mètres sur deux rangées, en quinconce, puis tous les 7 à 10 mètres sur les arbres intérieurs.

L'aérosol de glue fournie sert plusieurs fois pour réengluer les plaques jaunes. Il suffit de nettoyer les plaques avec de l'alcool avant de déposer la glue. Cette opération est à réaliser tous les 2 mois environ, ou dès saturation, en fonction.

PÉRIODE D'UTILISATION :

CERISE : la pose des pièges se fait, au plus tard, au moment où les cerises passent de la couleur verte à vert pâle avant de rougir.

OLIVE : les attaques de *Dacus oleae* (mouche de l'olive) débutent mi-août en situation côtière (Nice - Corse), début septembre pour les secteurs les plus septentrionaux. Plusieurs générations se succédant, il est donc important que les pièges soient en place dès l'apparition de ces insectes. La fin du piégeage se situe vers mi-novembre, le pic étant généralement situé en octobre. Toutefois, pendant les mois de juillet frais, des dégâts peuvent déjà être observés.

FIGUES : Pour les variétés les plus précoces, et en fonction de la zone géographique, les pièges doivent être mis en place à partir de début juin, puis conservés jusqu'à la récolte.

AGRUMES: Positionner les pièges dès que les fruits commencent à « tourner » (couleur vert vif au vert pâle).

NB : ne pas utiliser sur les végétaux.

Ne pas stocker au froid avant utilisation (T° > 18 °C).

Bien agiter avant chaque usage.

Pour éviter l'encrassement de la buse, après utilisation, retourner le flacon (buse en bas) et pulvériser quelques secondes.